

L'intervention Malakit : son déploiement sur le territoire guyanais par les Equipes Mobiles d'Intervention contre le paludisme (EMIP et EMIPaL)

Carboni C^{1,2*}, Houssais L^{3*}, Levarato T^{4*}, Petit Sinturel M^{1,2}, Rose M⁴, Da Conceição Lima G⁴, Matallana Gutierrez C⁴, Perreira D³, Aquino De Ulerio R³, Perez Aranguena D³, Nasare De Oliveira A³, Lambert Y^{1,2}, Michaud C⁴, Boutrou M⁴, Daverton B⁴, Oberlis M³, Douine M^{1,2}

1. Institut Santé des Population en Amazonie, Centre Hospitalier Universitaire de Guyane – Site de Cayenne, Cayenne, Guyane; 2. Centre d'Investigation Clinique (CIC) Inserm 1424, Centre Hospitalier Universitaire de Guyane – Site de Cayenne, Cayenne, Guyane; 3. Croix-Rouge Française, Cayenne, Guyane; 4. Centres Délocalisés de Prévention et de Soins, Centre Hospitalier Universitaire de Guyane – Site de Cayenne, Cayenne, Guyane

* Les auteurs ont contribué de manière égale



Méthodologie





Les équipes EMIP et EMIPaL (médiateur et IDE) délivrent les malakit aux orpailleurs après une **formation individuelle** dans des **structures de soins** et des **zones de passage**. Via un formulaire digitalisé, les équipes recueillent les **données** sociodémographiques, ATCD de paludisme et l'utilisation passée de malakit.

Résultats

Entre juillet 2024 et mars 2025: **301 malakit délivrés**

Population:

- **59%** sexe masculin
- **43 ans** en moyenne
- **94%** nés au Brésil
- En Guyane depuis **9 ans**
- ATCD de paludisme chez **67%** dont **17%** l'année passée



Discussion et Conclusion Le déploiement de Malakit comme action de santé publique est en cours en Guyane: augmentation croissante des délivrances de kit, bonne compréhension de la formation et utilisation correcte du kit dans le 78,6% des cas. Résultats concordés avec le projet de recherche.