

## 7

# FACTEURS DE RISQUE DE MALADIE RÉNALE CHRONIQUE CHEZ LES PATIENTS DIABÉTIQUES EN GUYANE FRANÇAISE

Christopher Sacareau<sup>1</sup>, Mathieu Nacher<sup>2</sup>, André Ntoutoum<sup>1</sup>, Antoine Adenis<sup>2</sup>, Marianne Hounnou<sup>1</sup>, Marion Liebart<sup>1</sup>, Clara Salazar Cardoso<sup>2</sup>, Jean-Markens Aurelus, Magalie Demar<sup>1</sup>, Olivier Casse<sup>2</sup>, Samia Amokrane<sup>3</sup>, Jean-François Carod<sup>3</sup>, Nezha Hafsi<sup>1</sup>, Nadia Sabbah<sup>1,2</sup>

1 Centre Hospitalier de Cayenne, 2 Centre d'investigation clinique Antilles Guyane, 3 Centre Hospitalier Ouest Guyanais.

## Introduction

La Guyane française présente un contexte social et sanitaire dégradé par rapport à la France hexagonale :

- La prévalence du diabète est deux fois supérieure
- L'insuffisance rénale terminale 45% plus prévalente
- La précarité concerne près de 75% des diabétiques


## Objectif

Existe-t-il des facteurs de risque chez les patients diabétiques en Guyane Française associés à la maladie rénale chronique?

## Méthode

- Etude observationnelle transversale multicentrique (cohorte CoDiam)
- 1287 patients suivis au centre hospitalier de Cayenne, à Saint Laurent et dans les centres de santé délocalisés ont été inclus entre mai 2019 et juin 2021.
- Critère d'inclusion : présence d'un diabète confirmé
- Critère de jugement principal : présence d'une maladie rénale chronique, définie par un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60 ml/min et/ou une microalbuminurie

## Résultats



## Conclusion

- La précarité et l'origine étrangère n'étaient pas associées à la survenue de la maladie rénale chronique contrairement aux pays sans système de santé universel (Ex : Etats-Unis)
- La maladie rénale chronique touchent des patients diabétiques plus jeunes et plus obèses que en France hexagonale sans que des facteurs de risque spécifiques soient mis en évidence.