

21

La prématurité en Guyane: Le poids du Syndrome Pré-éclamptique?

Malika Leneuve-Dorilas¹, Stéphanie Bernard², Anne Favre², Alphonse Louis¹, Mathieu Nacher³

1. Obstetrics and Gynecology Service, Cayenne Hospital Center, 97300, Cayenne, French Guiana

2. Perinatology Network, 97300, Cayenne, French Guiana


3. Clinical Trials Center, INSERM 1424, Cayenne Hospital Center, 97300, Cayenne, French Guiana

Contexte : La Guyane Française, département-région d'outre-mer, compte près de 8 000 naissances par année. Depuis 1992, la proportion de naissances prématurées y est importante aux alentours de 13,5% ; soit presque le double de celle de la France (7%). Les décès liés à la périnatalité restent l'une des principales causes de mortalité prématurée dans ce département.

Méthode : Le travail de recherche relative à la prématurité se décline en plusieurs axes d'investigations, nous n'en citerons qu'un : Une étude rétrospective descriptive, à partir des données du RIGI (Registre d'Issue de Grossesses Informatisé) 2013-2014 de 12 983 naissances viables du département.


Résultats : Sur la période d'étude, la proportion de naissances prématurées était de 13,5% (1 755/12 983). Plus de la moitié (57,2%) de la population d'étude bénéficiait de la sécurité sociale, néanmoins 9,3% (1 211/12 983) n'avait aucune couverture sociale. L'absence de couverture sociale représentait un facteur de risque de prématurité avec un OR ajusté de 1,9 IC à 95% [1,6-2,3] p=0,0001. Le syndrome pré-éclamptique était la principale dysgravidie associée au risque de prématurité (OR ajusté de 6,7 [IC 95% =5,6-8,1] p=0,001).

Discussion : Les travaux réalisés ont retrouvé nombre de facteurs associés à la prématurité, pour certains déjà décrits par ailleurs. Bien qu'à l'échelle individuelle, il était impossible de prédire qui accoucherait prématurément, le poids des facteurs sociaux et du mauvais suivi de grossesse, suggéraient qu'une approche populationnelle pourrait être pertinente. Ainsi les femmes les plus vulnérables résidaient souvent dans des zones bien identifiées qui pourraient faire l'objet d'actions ciblées. Le poids du syndrome pré-éclamptique comme facteur de risque de prématurité induite en Guyane pose question, il semble nettement plus important qu'ailleurs pour des raisons qui restent à élucider.




La pré-éclampsie est une dysgravidie grave qui n'a pour réel traitement que l'arrêt de la grossesse. Cette naissance pour sauvetage maternel et/ou foetal peut survenir dans un contexte de grande prématurité.

Répartition des naissances prématurées selon la région de résidence, en 2014 (en %)



Champ • Naissances vivantes, France entière.
Source • PMSI-MCO (ATIH) ; exploitation DREES.



Source RIGI 2013-2014